

A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI HÓFORRÁS VIZÉNEK ALKALMAZÁSA

A „gyógyvíz-medencében” lévő fürdővíz:

Közepes összsó tartalmú nátrium-hidrogénkarbonátos hévizek csoportjába tartozik.

		mg/L	mmol/l (egyértékű ionban kifejezve)	Than-féle egyenérték %
Kálium	K ⁺	7,5	0,19	0,63
Nátrium	Na ⁺	660	28,71	95,19
Ammónium	NH ₄ ⁺	11	0,61	2,03
Kalcium	Ca ₂ ⁺	7,1	0,35	1,16
Magnézium	Mg ₂ ⁺	3,5	0,29	0,96
Vas	Fe ₂ ⁺	0,4	0,01	0,03
Mangán	Mn ₂ ⁺		nem mutatható ki	
Kationok összege		690	30,16	100
Nitrát	NO ₃ ⁻		nem mutatható ki	
Nitrit	NO ₂ ⁻		nem mutatható ki	
Klorid	Cl ⁻	193	5,44	17,57
Bromid	Br ⁻	0,15	0	-
Jodid	J ⁻	0,93	0,01	0,03
Fluorid	F ⁻	1,4	0,07	0,23
Szulfát	SO ₄ ²⁻	31	0,64	2,07
Hidrogénkarbonát	HCO ₃ ⁻	1510	24,8	80,07
Sulfid	S ₂ ⁻	-	-	-
Összes foszfát	PO ₄ ³⁻	0,93	0,01	0,03
Anionok összege		1737	30,97	100
Metabórsav	HBO ₂	18	-	-
Szabad szénsav	CO ₂	-	-	-
Oldott oxigén	O ₂	-	-	-
Arzén	As	< 0,005	-	-
Összesen		2493	61,13	
Kémiai oxigén igény	mg/L	18		
(KOI_{p1})				

A fürdőkúrák az alábbi betegségek kezelésére javasolt:

1. Sokféle ásványi só összetétel miatt elsősorban az összes reumás betegségek kezelésére lehet felhasználni.
Reumás betegségek ízület, izom és idegszabás bántalmaknál, sokizületi gyulladások idült formáinál, csúzos bántalmaknál, végtag idegizom gyulladásainál, derékszabás, gerincmerevedéses elváltozásoknál, gerinc-sérvek kezelésénél, izületi kopásoknál, elferdüléseknél, lúdtalp és más süllyedéseknél.
2. Sebészeti utókezelés formájában feltétlenül szükséges a csonttörések összes alakjánál a gipszelések utáni merevedések oldására. Kiválóan alkalmas sportsérülések utókezelésére, a rándulások, húzódások, izomgörcsök lazítására.
3. Belgyógyászati megbetegedések területén főleg az idült összenövések (mellhártya, hashártya lobosodások után) a tuberkulotikus kivételével, belső szervek idült hurutjainál, ahol eddig meleg borogatást, alkalmaztak (gyomorhurut, hasnyálmirigylob, epehólyagbántalmak, stb).
4. Ideggyógyászati betegségek jó részét már előzőekben ismertettük, de külön meg kell említeni a bordaközi idegszabás és az ülőidegszabás isiász kórképeket, főleg az idült szakban lehet sikerrel kezelni.
5. Távolhatásként migrénes fejfájások, idült orr, melléküreg, homloküreg és középfülgyulladásoknál is várható kedvező javulás. Ezek a területek nem érintkeznek közvetlenül a gyógyvíz tömegével, de a különböző ásványi sók a bőrön keresztül felszívódva fejthetnek ki kedvező hatást.

Összegezve: a fürdőkúrák alkalmazását elsősorban az idült betegségek szabják meg.

Javasoljuk, hogy a fürdőkúrák igénybe vételét a vendégeink a kezelőorvosukkal egyeztessék!

ELLENJAVALLAT ÉS TILOS!

Minden heveny, lázas betegségnél, heveny izzadmányoknál, szervi szívbajban szenvedőknél, vérnyomásoknál, mindenféle vérzésnél vagy vérzésre hajlamosságnál.

Melegvízben való fürdés mindig kerülendő a főétkezések után, legalább 2-3 óra multával szabad igénybe venni.

Idősebb egyéneknek lehetőleg csak a fürdőorvos előírása alapján lehet igénybe venni. A fürdőorvos előírása pontosan betartandó, mert ez is gyógy-tényező, amit csak adagolva lehet igénybe venni.

Törökszentmiklós, 2008. május 29.

Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Kft.